



INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

CAMYLLO

CARATTERISTICHE

CAMYLLO è un formulato specifico per applicazioni radicali e fogliari, a base di micorrize e microrganismi antagonisti con elevate capacità stimolanti.

Le Micorrize aumentano il numero di primordi radicali e garantiscono una maggior crescita e sviluppo radicale, incrementano l'assorbimento di nutrienti minerali come azoto, potassio e magnesio e specialmente di quelli a lenta diffusione nel suolo (fosfati solubili, zinco, boro).

Le bacillacee presenti nel prodotto, *B. amyloliquefaciens* e *B. lentus*, stimolano l'accrescimento radicale e aumentano la produttività della pianta attraverso: inibizione dell'attività di microrganismi deleteri nella rizosfera, aumento della disponibilità e relativo assorbimento di nutrienti, aumento dell'efficienza dell'apporto e dell'utilizzo di azoto, diminuzione e inattivazione di composti tossici o inibitori per lo sviluppo radicale, produzione di sostanze stimolanti (enzimi, fattori di crescita e ormoni naturali, vitamine).

L'impiego di CAMYLLO permette di migliorare la fertilità del terreno e l'efficienza della nutrizione, favorendo condizioni di maggior sanità della rizosfera a discapito di sostanze inibitorie per le piante e microrganismi patogeni che attaccano l'apparato radicale o il colletto delle piante quali *Pythium* spp., *Fusarium* spp., *Botrytis* spp., *Sclerotinia* spp., *Rizoctonia* spp. e *Verticillium* spp. e in quelli presenti nei residui della vegetazione rimasti in campo e sui semi quali *Alternaria* spp, *Colletotrichum* e *Pseudomonas*. La presenza di più specie di *Bacillus* spp. garantisce una rapidità d'azione molto elevata mentre la formulazione liquida ben si adatta a tutti gli impianti di distribuzione.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Colture frutticole, orticole, floricole e ornamentali

APPLICAZIONE	DOSE	MODALITÀ
Al terreno	200 g/1000 mq	Pre-semina Pre-trapianto Ripetere ogni 2 settimane
Fogliare	100-150 g/hl	In considerazione dell'andamento climatico e della durata della coltura

AVVERTENZE

Rispettare intervalli di 7-8 giorni da una applicazione all'altra. Nel caso di trattamenti più frequenti, ridurre proporzionalmente i dosaggi.

CONSIGLI DI UTILIZZO

In abbinamento con PROPOLI A , B , G per una distribuzione più omogenea e maggior adesione e persistenza , l'abbinamento con SUPERKING ne accelera lo sviluppo.

COMPOSIZIONE

Batteri della rizosfera
(*Bacillus Amyloliquefaciens*, *Bacillus lentus*)
1 x 10⁹ UFC/g

Micorrize, matrice organica

FORMULAZIONE

Soluzione liquida

REGISTRAZIONE

n. 0012038/15

CLASSIFICAZIONE CLP

Nessuna

DISPONIBILE IN CONFEZIONI DA:

1 kg - 5 kg