



Via San Carlo, 2130
40059 Medicina (Bologna)
tel 051 6971811 – fax 051 852884
biolchim@biolchim.it

CORASIL®

FITOREGOLATORE AUXINICO SPECIFICO PER AGRUMI

ANALISI

Diclorprop-P puro 2,7% (=25 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

OBIETTIVO	COLTURA	EPOCA	DOSE
			APPLICAZIONE FOGLIARE
INCREMENTO PEZZATURA	ARANCIO E SATSUMA	Diametro frutticini 20–21 mm	125 mL/hL*
	MANDARINO E CLEMENTINO	Diametro frutticini 13–15 mm	100–125 mL/hL*
	LIMONE	Diametro frutticini 22–25 mm	2–3 L/ha*
ANTICASCOLA	ARANCIO	Inizio invaiatura (cambio colore del frutto da verde scuro a verde chiaro)	60 mL/hL*

* Applicare al massimo 3 L/ha di prodotto nell'intervento per la pezzatura e 2 L/ha nell'intervento anticascola.
SU ARANCIO, MANDARINO E CLEMENTINO IN APPLICAZIONI TARDIVE UTILIZZARE 150 mL/hL.
SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE UN VOLUME D'ACQUA DI 1500–2500 L/ha.
DURANTE L'UTILIZZO DEL PRODOTTO FARE RIFERIMENTO ALL'ETICHETTA. PER LA CORRETTA APPLICAZIONE NELLE SPECIFICHE CONDIZIONI PEDOCCLIMATICHE E COLTURALI, SI CONSIGLIA DI CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO.
RISPETTARE I TEMPI DI CARENZA.

REGISTRAZIONE

n. 13135 del 18 Giugno 2013

PERIODO DI CARENZA

Arancio 45 gg.



CONFEZIONI
1–5 L

INDICAZIONI DI PERICOLO

Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2



H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

www.biolchim.com



il valore dell'esperienza
la forza dell'innovazione



CORASIL®

INSERITO NEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA E DELLA GDO

FITOREGOLATORE AUXINICO SPECIFICO PER AGRUMI

MIGLIORA ED UNIFORMA
LA PEZZATURA DEI FRUTTI

RIDUCE LA CASCOLA
FISIOLOGICA IN PROSSIMITÀ
DELLA RACCOLTA



SICURO,
A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
ED INCLUSO
NELL'ALLEGATO I



www.biolchim.com

CORASIL® è la soluzione pensata per gli imprenditori agricoli che vogliono produrre agrumi di qualità. Su arancio, mandarino, clementino e limone, **CORASIL®** migliora la pezzatura e perfeziona le caratteristiche organolettiche.

Applicazioni più tardive su arancio, riducono inoltre la cascola dei frutti.




- **SICURO:** Diclorprop-P è una sostanza attiva approvata in Europa ed inclusa in lista positiva (Allegato I), in quanto caratterizzata da basso impatto ambientale e priva di problemi di residualità.
- **FITOCOMPATIBILE:** **CORASIL®** stimola i processi fisiologici indotti dall'acido indolacetico (IAA), un'auxina naturalmente prodotta dalle piante che influenza anche l'attività cellulare nei frutti.
- **RICONOSCIUTO:** **CORASIL®** è adatto a tutte le tipologie di agrumi, è inserito nei disciplinari di coltivazione integrata ed è compatibile con i protocolli della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

UNIFORMARE E MIGLIORARE IL CALIBRO

CORASIL® stimola la moltiplicazione e distensione cellulare, agendo sulla dimensione e sull'elasticità delle vescicole che costituiscono il frutto. Si ottengono così produzioni di pregio in termini di calibro, aspetto, contenuto di succo e conservabilità. L'applicazione, aiuta inoltre a ridurre l'alternanza produttiva.

Nel trattamento per la pezzatura, Biolchim consiglia l'impiego di **CORASIL®** in associazione con **FYLLOTON** (2 L/ha) e **NITROCAM** (2 L/ha): i due prodotti assicurano l'apporto del calcio e delle sostanze nutritive indispensabili per il corretto sviluppo dei frutti e per una buona conservabilità post-raccolta, favorendo al contempo il superamento degli stress.



PROVA IN CAMPO


COLTURA: Clementino Comune

LOCALITÀ: Montalbano J. (MT)

Un intervento con frutticini di 14 mm di diametro.

Volume d'acqua 2000 L/ha.

CORASIL + FYLLOTON + NITROCAM
(150 mL/hL) (100 mL/hL) (150 mL/hL)



RIDURRE LA CASCOLA ANTICIPATA DEI FRUTTI

Se applicato in fase di inizio invaiatura, **CORASIL®** è in grado di ridurre o inibire l'abscissione, cioè la cascola dei frutti. Il trattamento consente inoltre di aumentare il valore della produzione attraverso l'estensione del tempo utile alla raccolta e la riduzione di difetti quali splitting ed ombelicatura.

Nel trattamento anticascala, Biolchim consiglia l'impiego di **CORASIL®** in associazione con **FYLLOTON** (2 L/ha) e **LIGOPLEX Ca** (2 L/ha): i due prodotti forniscono alla pianta calcio e sostanze nutritive, aiutandola a sostenere a lungo l'elevato carico produttivo e consentendole di superare lo stress ad esso correlato.



PROVA IN CAMPO


COLTURA: Arancio Navelate

LOCALITÀ: Spagna

Un intervento ad inizio invaiatura.

Volume d'acqua 2000 L/ha.

CORASIL + FYLLOTON + LIGOPLEX Ca
(60 mL/hL) (100 mL/hL) (150 mL/hL)



* forza necessaria a staccare i frutti.